

很多女性面临乳房发育不足、母乳喂养减少、乳房下垂等问题，因此很多女性选择乳房下垂矫正。那么采用什么样的切口来矫正乳房下垂呢？

乳房下垂矫正采用哪种切口以往治疗轻中度乳房下垂主要采用乳晕切开术和乳房下垂矫正术，将切口上部的月牙状皮下组织切除缝合，以提升乳头乳晕。乳房下垂整形手术主要包括三个基本步骤：提升乳头和乳晕、塑造乳腺、减少皮肤覆盖。埋藏引导缝合法矫正乳房下垂有两次缝合机会，特别适合在不适合或不可能切开皮肤的部位，通过小切口悬挂和固定缝合的组织和深层组织。轻度和重度乳房下垂病例的治疗。乳房下垂手术的手术切口设计是围绕乳晕设计的，其长度约为乳晕周长的1/2至2/3。乳房下垂矫正手术是根据设计切开皮肤和皮下组织，将乳房表面的皮肤和皮下组织瓣急剧剥离，分离乳房基部和乳房之间的交界处的手术。胸大肌对应第二肋间。下一步是缝合切口。乳房下垂矫正手术后，用6-0可吸收缝线间断缝合皮下组织，用3-0丝线间断缝合。乳房下垂手术后，定期放置引流带并使用绷带。哪些情况不适合做乳房下垂手术

1. 患有精神障碍或精神疾病的人。
2. 心、肝、肾功能不全者。
3. 内分泌疾病未控制者。
4. 已证实，疤痕体质的人不适合做乳房下垂矫正手术。
5. 有血友病、血小板减少症等明显凝血功能障碍者。