

丰满的乳房是女性的定义特征之一，但有些女性因为疾病或其他原因需要进行乳房切除术，而大多数女性在失去乳房后都感到自卑。乳房再造手术可以让女朋友的乳房变得更加丰满、坚挺，让她再次感到自信和有吸引力。

腹部组织乳房重建手术适应症

(1)乳腺癌治疗后3年无复发迹象者。

(2)急需立即进行乳房再造的1期或2期乳腺癌患者。

(3)婴儿期因感染、烧伤、X线照射、乳腺组织肿瘤切除等原因导致一侧或双侧乳房丧失。

(4)先天性乳腺发育不良者。

(5)如果患者急需乳房再造，在身体主要脏器无器质性病变的情况下，可考虑乳房再造。

腹部组织乳房重建术后护理

1.乳房再造术后应持续负压引流48小时，并用加压绷带覆盖手术伤口。

2.乳房再造术后12小时内，患者保持仰卧位，待硬膜外麻醉药效消失后改为半卧位。限制您的活动以减少出血或疼痛。

3.每小时静脉注射1500-200ml，静脉注射抗生素5-7天。

4、乳房再造术后48小时，打开敷料，拔除引流管，观察皮瓣或肌皮瓣的颜色变化，若出现紫红色，应立即进行相应的治疗和管理。

5、乳房再造手术后3-4天可能会出现38.5以下的发烧，这多为吸收性发热，可采用退热药或物理降温疗法来治疗症状。但如果5天后出现高烧，必须及时检查治疗，考虑是否存在感染，然后改用有效的抗生素。

6.乳房再造缝线一般可在术后7天间歇性拆除，术后8-10天应拆除全部缝线。为了使乳房固定和塑形，术后3个月内必须佩戴有弹力的胸罩，这样可以减少切口区域的张力，防止再造乳房下垂和变形。

腹部组织乳房再造是乳房再造手术中的尖端技术，可以塑造更自然的乳房。在这种

方法中，医生通过从患者的身体（例如患者的背部或腹部）中取出组织，并创建皮瓣、皮肤、脂肪和肌肉来创建新的乳房。手术后，这两种形状都会产生更自然、舒适的乳房。而且这种感觉很生动。