兔唇是一种常见的口腔畸形。对于唇裂的孩子来说，有时会影响孩子的言语、饮食、居住和交通，给孩子带来很大的精神压力。有些孩子因为别人的取笑而变得越来越不自信。因此，很多家长都会选择唇腭裂手术来缓解孩子的精神压力，而且手术后立即进食可以收到更好的效果。

唇裂儿童手术治疗的基本要求是尽可能恢复孩子唇鼻的正常外观和正常功能。健康孩子的嘴唇应该饱满，唇珠稍突出，嘴唇红边呈拱形。舌唇的发育不仅影响患者的美观，而且对孩子的某些日常行为有显著的影响，例如孩子的音标发音、吞咽、吸奶等。唇腭裂矫正术要禁止哪些事项？1.为防止术后伤口开裂，患者禁止大声哭泣或将手指或玩具放入口中。

2、术后2-3周内开始流质饮食，然后改为半流质饮食，1个月后即可正常饮食。3.如果患者哭声嘶哑，是喉咙肿胀的征兆，应立即进行激素治疗，并仔细监测呼吸状况。4.患者苏醒后拔除支气管插管，4小时完全苏醒后可给予少量糖水，观察30分钟。无恶心或呕吐。5、唇腭裂手术后8-10天，取出堵住两侧松散伤口的碘伏纱布，术后2周拆线。如果线内有感染，可以提前清除。唇腭裂如果您想了解更多整形价格，可以咨询大虎网在线整形专家或直接拨打大虎网整形预约热线：400-0937-795 整形资讯：。唇腭裂与两个因素有关准备唇腭裂矫正手术