

“兔唇”在医学上称为唇腭裂，其形状酷似兔子的嘴唇，故又称“兔唇”，那么“兔唇”是由什么原因引起的呢？“兔唇”如何修复？

“兔唇”的形成原因有哪些？

新生儿形成“兔唇”的原因非常复杂，而且胎位使得出生前很难察觉。遗传只是唇部畸形的原因之一。某些先天性综合症、罕见疾病的并发症以及染色体异常引起的遗传性疾病可能会导致宝宝出现“唇裂”。如果新生儿没有其他异常，可以通过手术矫正“兔唇”，但手术时机根据每个新生儿的情况而有所不同。

“兔唇”婴儿如何照顾？

唇裂婴儿在出生时需要特殊护理，并且由于他们进食困难，他们可能需要儿科医生的护理（例如静脉滴注或特殊喂养）以确保他们的病情稳定。

“兔唇”修复如何做？

同时，专家表示，唇腭裂整形手术的基本要求是尽可能恢复唇鼻的正常外观和功能。正常唇鼻的特点是两鼻孔圆形且大小相同，鼻尖和鼻小柱居中，鼻翼不塌陷，上唇等高且对称，红唇丰满，唇珠微凸，嘴唇丰满，点红边缘呈拱背形状。唇腭裂手术有旋转推进、三角瓣、方形瓣三种手术方法。其优点是组织保存较多，治疗后的上唇更加柔软，唇形更加整齐，唇珠清晰可见，疤痕较小。

“兔唇”何时做比较适合？

一般来说，单侧唇腭裂手术大约需要6个月，而双侧唇腭裂手术则需要更长的时间。儿童适合手术的基本条件是身体健康，无明显贫血，无上呼吸道感染，无局部或周围组织感染。