

简介：唇腭裂俗称唇裂，是一种比较常见的先天性唇部畸形，唇腭裂不仅严重影响孩子的面部美观，还严重影响孩子的发音和乳汁分泌。因此，有必要尽快进行唇腭裂手术。

兔唇原因

兔唇的原因兔唇是一种先天性唇部畸形，主要是由父母遗传、母亲怀孕期间营养摄入不足、内分泌系统等原因造成的，如果母亲吸烟、饮酒等导致人体虚损，则至关重要。怀孕期间，叶酸和维生素A、B还可直接导致新生儿先天性唇腭裂（兔唇）等畸形。然而，唇裂修复手术现在可用于矫正儿童唇裂和腭裂。最佳治疗时间是6个月至1岁之间。

什么是兔唇医学上称为唇裂，俗称唇裂，主要症状是孩子出生后唇部出现裂痕，根据裂痕程度分为轻度、中度三个等级裂缝。而且很严重。如果裂纹仅出现在嘴唇的红色部分，则被认为是轻度裂纹；如果裂纹延伸到嘴唇的白色部分而不是鼻子下方，则被认为是中度裂纹。嘴唇上的白色区域被认为是严重的。应根据孩子的严重程度和位置来确定唇裂修复的手术计划。

兔唇修复方法

唇裂矫正方法有多种，包括旋转推进法、三角瓣法、方形瓣法等。必须根据孩子的情况进行选择，不进行唇腭裂手术很难一次手术达到完美的效果。轻症可能需要1至2个阶段的恢复，重症可能需要2至3个阶段的恢复。可能需要手术。

兔唇修复注意事项1.唇腭裂矫正后，孩子的饮食习惯必须改变，从让孩子吃奶变成用勺子给孩子喂奶。

2.保持孩子保暖，注意不要着凉，以免流鼻涕过多引起伤口发炎。

3.保持创面清洁，防止术后分泌物感染。

4、注意不要让孩子用手抓伤伤口。