

有的病例唇腭裂整形术后并没有取得满意的效果，有的病例还存在一定的缺陷，这种术后畸形通常称为术后唇腭裂畸形。唇腭裂手术后矫正畸形的合适时机基本上是在患者面部发育完成后。那么，你知道唇腭裂手术后畸形矫正的时机和注意事项吗？下面我们就来看看吧！唇裂术后畸形整复的时机

在西方国家，唇腭裂手术需要进行四次或更多手术。

第一：出生后4天内可以进行手术。

其次，在幼儿园，身体还在发育。

经过三个阶段，成人进入社会，身体发育完成。

婚前四次。

在韩国，术后康复的要求比较高，通常需要进行1到2次手术，一般认为在成人进入社会之前进行比较合适。唇裂术后畸形修复术注意事项

- 1.保持手术切口部位清洁，防止流鼻涕污染伤口，并及时清洁。
- 2.手术后为预防感染，请按照医生的指示口服适量抗生素。
- 3、伤口清洁必须在医护人员指导下进行，切勿不慎清洁或损伤伤口。
- 4.手术后，用勺子或滴管喂食，不要吮吸。如果伤口没有感染，切口缝线一般在术后67天即可拆线，如果个别缝线周围有感染迹象，应及时拆线。

1. 畸形严重，单次手术无法完全恢复时。
- 2、病儿年龄太小，唇部精细结构和畸形尚不明显，手术时无法矫正所有畸形。
- 3.因缝线张力过大或感染导致伤口部分裂开；
- 4.手术时畸形并不明显，但随着唇、鼻、上颌骨的不断生长，出现了新的畸形。造成唇裂术后畸形的原因唇腭裂手术后整形时常见的问题有疤痕、不对称、唇色不均匀、前唇短、鼻梁凹陷、鼻子塌陷等。需要进行下一步手术。