

简介：女性无意中发现腋下肿块，可能会在经前或月经期间感到肿痛，以及乳房肿痛，甚至可能误认为是乳腺肿瘤。辅乳牛奶。副乳实际上是人体的一种退行性、不完美的现象，不仅影响美观，还会带来健康风险，所以如果有必要且有资格的话，美容专家可以通过手术将其切除。

1、现有的辅助乳房手术是在腋窝皱襞或辅助乳房表面切开约3cm的切口，锐性或钝性地将辅助乳房与辅助乳房分离后，通过手术切除辅助乳房组织。术后需要加压包扎，7天后拆线，一般不会对工作造成明显干扰。

优点：如果副乳含有乳腺组织，可能存在乳房肥大的情况，所以通过传统手术切除副乳比较彻底。

缺点：传统手术通常是直接在副乳上切开一个切口，这不可避免地会留下疤痕。

此方法适合次乳房较大、乳房组织较多的求美人士。

2、微创抽脂微创吸脂可以解决因脂肪堆积而引起的隆胸问题。和其他部位的抽脂一样，这是在局部麻醉下进行的，因此伤口只有0.5cm左右，创伤最小。

优点：术后不影响日常生活，一周后即可恢复日常生活，非常快捷方便，不留疤痕。

缺点：这种方法不适合副乳较大的人，因为吸脂量太大，这是因为吸脂后皮肤变得松弛，大片皮肤脱落。

此方法适合追求美、副乳小、皮肤弹性好的人士。

温馨小贴士：由于所有的手术都涉及风险，所以规避风险的最好办法就是术前选择正规的整形医院和专业的整形诊所，做好术前术后的准备，保证手术的安全，保证手术结果的可靠。