

唇裂修复手术是如何进行的？有些新生儿，出生后如果出现唇裂、腭裂，会严重影响嘴唇的形象，因此，家长想知道如何尽快治疗孩子的唇腭裂。下面看看专家的详细介绍，帮助您更清楚地了解。

唇裂修复手术主要有三种方法，即旋转推进法、三角瓣法、矩形瓣法。根据唇腭裂的程度和类型，需要采用不同的修复方法，一般在医院面诊后，医生会根据个人情况进行修复治疗。唇裂修复如何进行？1、先找出唇红缘的点在唇健侧红缘处找到唇顶点D和人中点C，然后按 $CB=CD$ 确定B点。确定患侧猩红色边缘较粗的B'点。手术时，将B和B'两点缝合在一起，形成患侧唇尖。2、测量两个基本数据测量正常鼻孔底部和受影响鼻孔底部从鼻翼根到鼻小柱根的宽度，并将差值设置为X。h是从健侧鼻梁中点到D点的距离，即正常唇高，即手术后应恢复的上唇高度。3、定出其他各点，划线手术要求细致、轻便、减少创伤、切口精确、缝合整齐。完全性唇腭裂的情况下，唇裂较宽，张力较大，因此必须切开前庭沟并秘密分离，以便更容易将组织缝合到位。这是唇腭裂手术的最后一步。唇裂修复注意事项：1. 预防线状疤痕挛缩，选择不直接缝合唇部的手术方法，珍惜组织，尽量减少切除。2. 应进行唇裂修复术，改变异位裂肌的位置，恢复肌肉的连续性，促进生理功能的恢复。3、婴幼儿唇裂矫正应同时矫正鼻小柱弯曲、增加身高、矫正鼻翼移位、恢复鼻孔对称性，促进鼻部正常发育。4、恢复上唇高度至正常，使人中位于中心，上唇两侧对称，上唇自由缘较下唇前移，下唇倾斜稍微向前。尽可能恢复唇弓的连续性，使嘴唇的两个顶点对称。