

唇腭裂手术后造成畸形的原因是什么？如果唇腭裂治疗失败或未产生满意的结果会怎样？这个时候就需要唇腭裂矫正手术的帮助。那么，什么是唇腭裂术后畸形矫正，唇腭裂术后畸形的原因是什么？我们一起来了解一下吧。唇裂术后畸形的原因有哪些1. 畸形严重，单次手术无法完全矫正时2.

患者年龄太小，唇部精细结构及畸形不明显，无法完全恢复畸形时3.

缝合过多时，由于张力或感染，可能会导致伤口局部裂开。 4. 手术时变形不明显，但随着唇、鼻、上颌等部位的继续变形为了成长，新的畸形出现。唇裂术后畸形修复术注意事项1、保持手术区域清洁，防止伤口被流鼻涕等污染，并及时清洁。 2. 手术后，按照医生的指示口服适量抗生素，预防感染。3.伤口的清洁必须在医护人员的指导下进行，不要不小心清洁或损伤伤口。 4.手术后，用勺子或滴管喂食，不要吮吸。如果伤口没有感染，切口缝线一般在术后67天即可拆线，如果个别缝线周围有感染迹象，应及时拆线。

温馨提示：唇腭裂手术后虽然可以大大改善唇形，但受手术者手术水平和上唇生长发育的影响，仍然会造成上唇明显的二次变形，从而导致上唇畸形。影响唇形。对于其外观，需要进行手术治疗，即所谓唇腭裂手术后矫正畸形。