

唇腭裂手术后的继发畸形包括患侧上唇扁平、唇部凹陷、鼻畸形、患侧鼻梁凹陷、鼻子扁平下垂、鼻尖低、口咽闭合不全等。腭裂手术后，如果术后上腭残留洞，并且再次残留腭裂，如果中面部三维发育不足，如果上颌牙弓狭窄，如果牙列密集且不均匀，如果咬合关系受到干扰，这包括前牙或整体反咬合。牙列、言语功能异常。

可通过手术整复的唇结构缺损、形态异常：1.朱红畸形：朱红缺损、朱红厚度过大、患侧朱红边缘退缩、唇肩峰凹凸不平、唇肩峰上移。

2、唇部畸形：唇高过短、唇高过长。 3、双侧唇裂手术后继发畸形：唇缘红呼啸畸形、唇弓形状不清晰、前唇过短、前唇过宽、上唇过紧。可通过手术整复的鼻畸形：1.鼻翼软骨脱位：鼻尖分离、偏离，鼻翼凹陷，鼻孔形状不对称，鼻翼后方皮肤及鼻前庭粘膜皱襞凹陷，鼻小柱短小患侧2.

鼻翼根部异常部位：患侧鼻根部过宽且患侧鼻根部过窄时3.

鼻孔过大或过小时4、方向和方向太小时鼻小柱长度异常5、鼻尖凹陷。