

唇纹通常是胎儿时期嘴唇发育不完全造成的，除了遗传因素外，还有酗酒、吸烟、怀孕期间过度劳累等人为因素。他们的宝贝就是嘴唇。但如果出现这种情况，你应该主动去做唇部矫正手术。那么矫正唇形时要注意什么呢？

兔唇修复的注意事项：

### 1、手术时机

一般情况下，单侧唇腭裂手术3~6个月内为宜，双侧唇腭裂手术则稍有延迟。儿童适合手术的基本条件是身体健康，无上呼吸道感染，无局部或周围组织感染。

### 2、唇裂修复的手术方法

唇裂手术的基本步骤是部位设计、切口、唇裂和鼻肌的缩小和连续性以及皮肤缝合。设计锚定点的方法有很多种，不同的医疗中心和医生可能会根据唇裂的具体情况采用不同的手术方法。

### 3、手术后处理

(1)用钢丝唇带固定上唇2周，以减少张力，防止伤口张开，减少疤痕愈合。

(2)基础麻醉苏醒后，应用夹板和绷带固定双肘关节，防止抓伤伤口或缩小唇弓。

(3)用3%过氧化氢和碘伏轻轻清洗唇部伤口，防止血痂覆盖，影响伤口愈合。

(4)5至7天后拆线。

### 4、术后序列治疗

唇腭裂手术是在婴儿早期进行的，但随着孩子的成长发育，章鱼区域会出现各种畸形，这些被称为唇腭裂手术后的继发畸形，在幼儿园需要进行额外的整形手术。牙槽骨骨折的患者在12岁左右需要进行植骨手术，继发颌骨畸形的患者需要在成年后进行正颌手术，以进一步改善面部形状和咬合功能。