

唇腭裂主要是由于新生儿先天性缺陷和唇部畸形而发生，对唇腭裂患者的外观和生活有重大影响，因此很多医生建议唇腭裂手术。您有唇裂和腭裂矫正手术吗？

一、定点的设计

在唇腭裂矫正整形手术的固视点设计过程中，首先需要找到唇红缘上的点，在准确定位的基础上确定唇顶点的位置。第二步是根据轮廓的两个基本数据，测量正常鼻孔底部和受影响鼻孔底部从鼻孔底部到鼻小柱底部的宽度。

发现两者的区别如下：从健侧鼻梁中点到唇顶点测量的距离就是正常唇高，即唇腭裂整形术后需要恢复的上唇高度。外科手术。第三步，找到嘴唇上的每个点并画线，避免因手术过程中的不确定性而延误唇裂矫正整形手术。

二、切开与缝合

这是唇腭裂整形手术的另一个重要环节，不仅需要点与点之间的细致缝合，而且需要分层缝合。在唇腭裂整形手术过程中，整形外科医生需要细致、轻便、干净的缝合，以尽量减少创伤。在修整红唇的过程中，为了增加口红的体积，美容师应根据情况采用相应的内置式或Z形双三角瓣法。

目前常用的唇腭裂修复整形方法有旋转推进法、三角瓣法、方形瓣法等。所有这些都具有保留大量组织并避免上唇手术带来的长期不良后果的优点。嘴唇或上唇的动态畸形。唇腭裂手术看似简单。

事实上，整形外科医生的专业技能和经验要求非常高，不仅需要大量的解剖定位经验，而且对唇腭裂矫正整形手术过程的各个环节都要求娴熟。唇腭裂整形手术的原因是出于安全考虑。