

兔唇病是一种多基因遗传病，由多个基因突变引起，因此存在特定的遗传风险。一般来说，对于生育过唇腭裂孩子的夫妇来说，再生育一个孩子的风险是2%到4%，如果家庭中有两个或两个以上唇腭裂孩子，生出患有唇裂或腭裂的孩子的风险为2%至4%。就嘴唇而言，这一比例可能约为10%，因此，如果一对夫妇有卵巢癌病史，建议在产前检查期间进行早期筛查。

唇裂又称唇裂，是一种常见的先天性发育缺陷。导致这种疾病的因素有很多，遗传是重要因素之一。如果父母一方患有唇裂或腭裂，则可能会遗传给孩子。也可能与维生素A、维生素B2、叶酸缺乏等营养因素有关。它还可能与感染或受伤有关，例如不完全或不科学的流产。它还可能与内分泌激素（例如肾上腺皮质类固醇）的增加有关。怀孕期间吸烟或饮酒也可能增加唇裂和腭裂的风险。

兔唇的形成原因：

脂血症患者主要在胎儿发育过程中出现各种相应的畸形，尤其是胎儿发育的前12周，当胚胎过程的正常发育和融合受到某些因素干扰时，可能会出现各种相应的畸形。目前，其病因和发病机制尚不完全清楚，主要可能的因素包括：

- 1、遗传因素与遗传有一定关系。
- 2.营养因素，孕期维生素缺乏。
- 3.感染和损伤、子宫损伤、病毒感染等。
- 4.内分泌作用，增加肾上腺素分泌。
- 5.药物因素有些药物，如环磷酰胺、甲氨蝶呤、苯妥英、抗组胺药、美其嗪、沙利度胺等，可引起胎儿畸形。
- 6.物理因素、辐射暴露、微波炉。
- 7、烟酒因素怀孕初期过度吸烟、吸二手烟、酗酒也会造成畸形。