

唇腭裂，又称“唇腭裂”、“腭裂”，表现为裂口，尤其是上唇。其范围可以从嘴唇破裂到从鼻根到整个嘴巴的完全破裂。社交媒体对人们的思想和精神非常有害。手术速度越快，费用越高，但考虑到综合因素，特别是患者的安全，一般建议在6个月内治疗唇裂或腭裂。双侧唇腭裂治疗12个月即可达到预期效果。

唇腭裂的详细治疗需要多次手术，包括唇裂手术、腭裂手术、咽部回缩手术、牙槽嵴手术、鼻中隔软骨整形手术、口红手术等。手术次数因病情而异。另外，在整个操作过程中必须提供音频和视频培训，这是一个长期的过程。事实上，唇裂手术的目的主要是为了解决美容缺陷，如果在年轻时进行手术，由于解剖标记不清晰、错位，预期的手术效果是不合理的。随着年龄的增长，患者会因唇腭裂及缺乏约束而持续患病，并倾向于双侧发展，使畸形加重，因此一般最佳手术年龄为36个月。造成唇腭裂的原因：遗传因素：在某些情况下，直系亲属或直系亲属也可能出现类似的畸形。大约20%的唇腭裂患者被发现有遗传病史。感染及风险：母亲在怀孕初期（约2个月）感染流感、风疹等病毒感染或有感染风险的母亲，可能成为唇腭裂的病因。孕妇在怀孕期间会出现贫血、糖尿病、严重营养失调等慢性症状。怀孕期间服用某些药物：镇静剂、抗癫痫药、激素等。孕妇在怀孕期间接受过量的X射线辐射。