

简介：关于唇腭裂你了解多少？我相信您以前不知道这一点，但是当您准备成为母亲时，您会密切关注，但怀孕期间收养不当等因素可能会导致您的宝宝出现唇裂或腭裂。婴儿需要尽快进行唇腭裂手术，但为什么唇腭裂手术后出现畸形的患者如此之少呢？

唇腭裂术后畸形的原因有很多，主要症状包括红白唇形状异常、鼻尖不正确、鼻孔大小不一、上颌畸形等。唇裂修复手术通常可以恢复嘴唇，但一些影响手术效果的因素也不容忽视。

唇腭裂手术后造成畸形的原因是什么？

1.修复手术失败：手术方式的选择对修复手术的成功影响很大，主要由唇裂患者的严重程度决定，例如二度唇裂和窄腭裂，无鼻也可以考虑移位，改良的下三角肌皮瓣法可以取得更好的效果，对于三度唇裂，当鼻翼移位明显且鼻小柱弯曲时，莫氏肌功能性解剖复位可以使用。

2.变形部分未完全修复时：有些情况下，第一次手术时畸形不明显或没有出现，也没有完全恢复，而另一些情况下，唇裂畸形修复手术需要几天的时间出生后。这次，儿童接受唇腭裂手术的可能性更大，而在幼儿中，春红的边界不清晰，无法用以前的手术解决。

3、医生技术不好：任何手术的成功都离不开医生的技术，唇腭裂手术是一项难度很高的整形手术，对医生的要求很高。

您知道唇腭裂术后畸形的原因吗？唇腭裂手术应及时进行，但不能过于盲目，应由专科医生检查评估后确定手术时机和治疗方案，以防止唇腭裂术后畸形。外科手术

。