

有的病例唇腭裂整形术后并没有取得满意的效果，有的病例还存在一定的缺陷，这种术后畸形通常称为术后唇腭裂畸形。那么唇腭裂手术后畸形矫正有哪些症状呢？唇裂术后畸形修复的症状

1、红唇边缘粗糙。

发生这种情况的原因是唇腭裂手术期间红唇边缘的位置不正确，或者缝合时两个伤口边缘的对齐不正确。一般采用双三角组织瓣法进行矫正。

2.鼻孔异常

鼻孔异常可能是指鼻孔太大或太小。鼻孔肥大的特点是健侧鼻孔过宽、过平、不对称。经常出现这种情况是因为唇腭裂矫正手术时唇腭裂两侧的固定点距离唇裂边缘太近。在鼻孔底部选择两个新点，将菱形组织切成小块并将它们缝合在一起。

3、支柱的偏差

单侧唇腭裂的特点之一是小柱偏向健侧，如果手术中无法矫正这一缺陷，术后小柱仍会偏斜。如果两个鼻孔大小不同，可以通过双三角皮瓣移植来重建鼻孔。

4.错误的鼻尖和凹凸的鼻梁

鼻尖错位和鼻翼塌陷是唇腭裂的特征，无法通过初次整形手术矫正。矫正的原则主要是使鼻软骨恢复到正常位置。在鼻尖和鼻梁处做一个连接鼻尖和鼻梁的弧形切口后，切开，露出两侧的鼻翼大软骨，将患侧背面的软骨分离，然后将分离的鼻翼软骨分离出来。较大的鼻翼软骨被分离。围绕两侧中线进行缝合，将患侧缝合，此类畸形可通过抬起外侧软骨来矫正。

5.鼻小柱太短。

鼻小柱短、鼻尖扁平是双侧唇腭裂术后常见的继发畸形。可以通过V形整形术和Y形整形术进行矫正。沿鼻小柱两侧前缘切开，使蒂位于鼻尖，接触上唇中央，作V形切口，Y形缝合，然后推入向上。加长柱子。唇裂术后畸形修复的原因

手术并不能逆转所有畸形，因为有些畸形在儿童年幼时并不明显或不会出现。目前，我国唇腭裂矫正的年龄范围一般为出生后2个月至2岁，出生后几天内即可进行唇腭裂矫正手术。此时患者年龄较小，朱红边界不清，鼻下移位尚轻微，手术时无法解决。

对于唇裂患儿来说，最佳手术时间被认为是6个月至1岁之间，麻醉不仅安全，而且有助于矫正，降低术后畸形的风险。一旦出现这些畸形，就只能通过唇裂手术和畸形修复来矫正。

温馨提示：医院和医生在选择唇腭裂术后畸形矫正手术时一定要慎重，宜进行两期或多期手术，以增加治疗效果，弥补一期手术的缺点。