

多乳房畸形该如何矫正？多乳头、多发性乳房畸形给患者带来一定的心理影响。有些人由于对这种疾病缺乏了解，不敢正确看待，也不愿意向别人透露自己内心的痛苦，生怕常人另眼相看。久而久之，患者的精神会变得非常压抑，人也会变得安静。患者可以接受手术治疗。

由于乳腺癌可能发生在多个乳头或乳房，因此可以通过手术切除来治疗。但多发性乳腺病患者体积小、无明显症状则不需要治疗。如果腺体逐渐增大并引起疼痛和不适，如果感觉副乳有异常肿块并怀疑与肿瘤有关，如果有乳腺癌家族史，或者副乳存在异常，则需要手术治疗。明显突出。增大的乳头或乳晕色素沉着影响外观。1.发育完全且不完全的副乳，如果在月经、怀孕或哺乳期间出现周期性或不规则的疼痛，并对患者的健康产生重大影响，可以手术切除。

2.如果副乳较大，影响上臂的内收运动和外观，可以手术切除。

3.若怀疑恶性肿瘤且无法与结核或其他病变鉴别，宜行切除术。4.所有可疑的附件乳腺肿瘤均应切除。对于额外乳腺癌的患者，必须排除正常乳房内的癌症，手术方法是将患侧和正常乳房的额外乳腺癌切除，然后进行同样的腋窝淋巴结清扫术。边。手术后，根据副乳的位置，定期进行放射治疗和化疗。定期仔细检查双侧乳房，尤其是同一侧乳房。5.对于发生于乳腺尾部的附件乳腺癌，行同侧乳房外上象限段切除术或单纯乳房切除术联合腋窝淋巴结清扫，术后根据情况给予放化疗。6.对于乳头、乳晕无乳腺的患者，由于恶变的情况很少见，即使以后哺乳症状消失也不必手术。

多个乳头和多个乳房畸形有引发乳腺癌的风险，因此患者必须及时通过手术进行治疗。手术治疗可以让患者更好地恢复正常生活，获得更好的身心发展。我们祝愿患者手术成功，身体健康。