

十分之九的纹身艺术家害怕纹唇。纹唇是一项技术性很强的工程。许多纹身艺术家在完成唇部纹身后面临一些问题，特别是由于手术或护理不当可能出现的并发症。

下面我们就来看看半永久纹唇时常见问题的预防和解决方法。

### 浮肿

预防：为防止手术过深或皮肤不同深度而引起肿胀，需要多练习，进针平稳、均匀。

治疗方案：用生理盐水清洗伤口后，将甲硝唑研碎涂于唇部，冷敷消肿，48小时内口服消炎药。

### 麻醉烧伤

预防：麻醉前一定要在嘴唇周围均匀涂抹花果油，以保护皮肤，防止麻醉烧伤。

治疗方案：保持唇部干燥，涂抹马应龙修复受损皮肤。

### 麻醉烧伤

预防：麻醉前一定要在嘴唇周围均匀涂抹花果油，以保护皮肤，防止麻醉烧伤。

治疗方案：保持唇部干燥，涂抹马应龙修复受损皮肤。

### 乘法

半个月后，嘴唇、部分唇部或唇部出现斑块，出现干燥、脱皮、瘙痒、硬块等现象。

产生原因：由于顾客的疤痕体质、交叉感染、进针过深等原因，可能会导致增生。

治疗：涂抹伊洛松和曲安奈德软膏进行舒缓。

3个月后，进行激光或机械创伤代谢性色素沉着治疗。或者，注射2%曲安奈德溶液。

### 排除

有身体本身引起的排斥反应（持续脱皮）、有色化妆品的副作用引起的排斥反应（

局部肿块伴有脱皮)、排斥反应过度增殖等。

治疗方案：配合口服氯雷他定片使用。

手术后嘴唇变黑

24小时内变黑：唇部上方深层表皮粘膜被空气脱水氧化，一周内恢复自然代谢。

嘴唇术后结痂变黑的现象：这是新生表皮和粘膜代谢不自然的现象，脱落的速度因个人体质而异，所以要用热毛巾促进代谢。

口服：七七人参片，保持嘴唇湿润。

术后护理也很重要，所以如果你刚刚做了半永久纹身，你应该听听纹身师的建议，保护好你的嘴唇。