

乳房对于女性的健康非常重要。如今的微创手术技术不断变得更加综合和深入，有助于避免传统乳房切除手术留下的明显疤痕。整形专家详细讲解乳房切除术的原理及其神奇效果。不过，专家提醒我们，由于隆胸疾病的严重程度因人而异，所以具体的隆胸手术也有所不同。

据专家分析，副乳主要发生在腋窝前或胸部下方。临床症状是皮肤上有色素沉着的斑点，中心深，周边浅，局部皮肤变厚如乳头，有的病例乳房上附着有少量乳腺组织，但有的病例则有少量乳腺组织附着在乳房上。情况下，没有乳管。也有副乳的乳腺和关系发育完全，在哺乳期间分泌乳汁的情况。临床上，副乳应与脂肪瘤（通常不对称）和肿大的淋巴结（质地坚硬且凹凸不平）相鉴别。在月经初期，乳房会肿胀、疼痛。

由于附件乳有发展为癌的可能，影响美观，手术切除往往是主要的治疗方法，切口应在与皮肤线重合的隐藏腋窝皱襞处。最近随着吸脂技术的进步，也可以考虑吸脂，可以进一步隐藏疤痕。

还采用真空辅助粗针切片（微创手术），使用真空辅助粗针切片工具重复采集标本，大大提高了粗针切片的临床实践。实际手术可以通过超声或乳腺X线摄影引导，插管的直径为8至14，允许通过单个切口进行多个入口和出口，并且可以360度旋转以扩大角度和范围。它还可以用在切片区域，您可以对其进行标记，以帮助将来的乳房切除手术或跟踪参考。