

丰胸是比较常见的乳房问题，丰胸一般对生活影响不大，但如果引起一些不适当的疾病，就要及时治疗和切除。那么乳房切除术是如何进行的呢？对哺乳有影响吗？

隆胸手术是在局部麻醉下进行的，切口部位可以设计在腋下前方，通过皮肤切口分离出皮下组织，然后切除副乳的所有乳腺组织。乳晕，拆线的时候拆线，也需要拆线，可以一起拆，做个乳房切除手术，穿加压绷带，一周内拆线。

对日常工作和学习影响不大，不影响大家正常哺乳，整体手术一点也不复杂。在普通医疗整形诊所进行乳房切除手术时，恢复速度更快，效果也更好。

二次乳房切除手术使用肿胀麻醉技术抽吸局部隆起的二次乳房组织，直至将其切除。这些手术伤口小，不需要缝合，患者术后恢复很快。由于副乳的解剖结构较正常乳腺不太清楚，辅助乳切除术后常有复发的可能，因此术前必须设计手术范围，以保证切除完整。

辅助乳房切除术因其操作简单、损伤小、失血量少、恢复快、符合美观和微创要求而容易被患者接受。对于有腋臭的患者，可以同时进行辅助乳房切除术，在不影响手术效果的情况下，可以有效去除腋臭。