

乳房切除术可能有哪些风险和并发症？其实，大多数女性都会担心自己的副乳，虽然副乳看不出来，但是穿吊带的时候就可以看到，尤其是夏天，暴露副乳非常尴尬，影响美观。医生说，如果我做了隆胸手术，应该及时切除，以防日后出现问题。

副乳切除术可能存在哪些风险和并发症？副乳属于多乳症，是指除了正常的一对乳房外，还多有一个乳房，通常在前面或腋下。副乳的存在主要是因为人类发育初期有6至8对乳腺，现在乳房中只剩下一对，但如果发育异常，多个乳房仍然存在。形成了副乳切除术有哪些优缺点？乳房切除术可能产生哪些风险和并发症？

1. 水肿：水肿一般是由于手术时损伤血管而产生，术后短时间内可能会消失。
 2. 感染：如果手术过程中发生感染，发现后必须立即就医。
 3. 切口裂开：切口裂开可由多种原因引起，因此一旦发现应立即就医。
 4. 如果手术切除时腺体组织尚未完全清除，无法明确找到腺体来源，建议再次进行手术治疗。
- 如果副乳进行切除其手术过程怎样？
1. 将患者置于仰卧位，准备局部麻醉。
 2. 作适当大小的水平切口，通常在腋窝的水平壁上。
(如果将切口向上移动，会更好隐藏。)
 3. 释放两个皮瓣后，去除腺样组织和剩余皮肤。
 4. 安装负压引流管，缝合皮肤切口，加压包扎。
 5. 常规进行病理活检。