

尤其是很多不想接受隆胸手术的女性都想知道这个问题，小编表示：隆胸手术对健康的影响因类型而异。不完整的次生乳房，尤其是只有乳头和乳晕而没有腺体组织的乳房，对身体影响很小，没有患乳腺癌的风险。

全托乳房与普通乳房不同，其组织结构、生理特征、病理变化相同，而且受雌激素、孕激素、催乳素等女性激素的影响，在月经周期或月经期间可能会出现肿胀、疼痛等现象。怀孕、母乳喂养期间，会分泌少量乳汁。有些胸部的辅助乳房有与正常乳房相连的秘密通道，因此分泌的乳汁可以排入正常乳房，而分泌的乳汁则积聚在不与正常乳房相连或没有乳头的辅助乳房中。因为：是一样的。无法引流，容易出现肿胀、疼痛、炎症甚至化脓。

此外，正常乳房可能发生的疾病，如乳腺炎、乳腺小叶肥大、乳腺纤维瘤和乳腺癌等，在辅助乳房中仍然可能发生，使其比正常乳房更容易受损。

更严重的是，副乳常常以各种方式进行伪装，不仅导致患者，也导致医生将目光移向别处，导致误诊。前两者都是炎症，治疗原理几乎一样，都使用抗乳腺药物，所以副乳炎症常被误认为是淋巴结炎症，或者副乳小叶肥大被误认为是脂肪瘤。 - 炎症；两者都是良性病变，不会构成生命威胁。

如果把漂浮型乳腺癌当成一般炎症，那就犯了方向性错误，将直接影响患者的生活。乳腺附件病虽然不是慢性病，但也不是轻微的疥疮病，需要适当的治疗。

完整的副乳，以及带有腺体组织的不完整的副乳，都容易发生癌变，建议尽早切除，消除隐患，尤其是在非手术期间偷偷“伸张威势”的情况。程序。正在经期、怀孕、哺乳期或出现肿痛的人，患乳腺癌的风险非常高，应及时就医，立即用手术刀解决问题。

哪些人可做副乳切除手术

这是每个想要进行乳房切除术的人都需要知道的事情。专家指出，副乳的治疗原则与主乳相同，如果没有疾病，则无需治疗，尤其是副乳较小的情况。然而，由于副乳房不是正常乳房，因此在以下情况下可以将其切除。

- 1、月经前经常生病、不适。
- 2.副乳有异常肿块、肿瘤。
- 3、由于副乳较大，影响美观，所以不需要手术切除副乳。

隆胸手术并不复杂，通常可以在局部麻醉下进行。切口部位可设计在腋窝前，通过皮肤切口分离皮下组织，切除副乳的所有乳腺组织，如果有乳头和乳晕也必须切除。手术后必须佩戴加压绷带，7天后拆线。通常，这不会对您的日常工作产生重大影响。