

副乳对身体有一定的作用，为什么会形成副乳呢？乳房切除手术时的注意事项有哪些？隆胸有哪些副作用？

副乳形成的先天原因：副乳，多发性乳房，是一种异常发育，其中特定区域的乳腺完全消失。它可以发生在乳房线的任何地方，但常见的位置是腋窝前面。腋窝中央和腹壁也可见到，有时也见于腹股沟，但很少见。

副乳形成的后天原因：副乳的出现可能是胚胎到成体不完全变态的结果，也可能是外力作用导致乳房变形的结果。长时间穿着不合适的内衣或太紧的衣服会给乳房带来压力。

乳房切除术后的注意事项

1. 由于麻醉效果不会立即消失，手术后可能会出现嗜睡的情况。出院后请充分休息，术后不要驾驶车辆或高海拔作业。睡觉时把枕头抬高一些。
2. 术后5天内不要提重物或进行剧烈运动。
3. 遵循医生的指示并按时服药可以减少手术后的不适。
4. 手术后冰敷手术部位3至4天，以减轻肿胀。
5. 手术后一周内注意不要弄湿手术部位，第四天后即使洗头也不要太用力摩擦脱毛部位。
6. 术后4天内避免运动。4天后可以进行轻度运动，10天后可以稍微增加运动量，但至少3周内不允许进行剧烈冲击运动。
7. 忌辛辣刺激食物。

注意：副乳切除是绝对必要的，爱美人士应选择综合整形医院进行手术。