

越来越多的人选择隆胸手术，但是很多求美者对隆胸手术的安全性还是心存疑虑。隆胸手术安全吗？有四个身份决定了隆胸手术的安全性接下来，逐一介绍这四个身份。

1. 物理前提

具有初级器官张力。，如心、肝、肾等器官有疾病；乳房组织有炎症、硬结、肿块；腋下淋着好玩又肿；疤痕体质和过敏体质；血液系统疾病；内部排泄系统疾病；怀孕、哺乳和月经期；生理停滞或有精神疾病的人不宜做隆胸手术。

所以隆胸手术前询问和检查病史，术后复查，避难是必不可少的。隆胸手术前要做双乳检查，然后必须做一些相关的检查，比如血常规、凝血时间、尿常规、肝功能、心电图、胸片等。最重要的是，要避开月经期。隆胸虽然不是什么高难度的手术，但是如果术前体检不严格，或者求美者隐瞒病史，还是会对人体造成挫伤。

2. 医院经营场所

隆胸手术前，需要考察选择的医院和医生。正规的业余整形医生必须具备我国认可的业余医师资格。选择正规的大型整形医院和医疗机构是安全隆胸手术的根本条件。

3. 隆胸材料

隆胸手术多采用假体或自体脂肪隆胸。假体隆胸几乎适合所有要求隆胸的求美者，因此是一种全新的隆胸方式。它的有效性和安全性*首先取决于使用的材料，这是求美者极其关心的核心。。目前隆胸的材料有凝胶和生理盐水，可以根据每个人选择合适的假体；的详细前提。假体的材料是医用高分子，假体的相容性很好，不会伤害人体。即使植入后凝胶破裂，凝胶也不会外渗和移位。。不会对人体造成挫伤。

4. 隆胸薄语

隆胸手术过程中，薄语在哪里，是否清晰，是否有疤痕等。也是求美者非常关心的问题。。一般来说有乳晕、乳房皱襞、乳房皱襞、腋窝皱襞。目前是腋下微创薄语。它的优点是选取腋下的自然褶皱，长度在3cm左右。术后用无损线缝合。痊愈后薄语有阴影，疤痕不清晰。更让人放心的是，不会损伤乳腺组织，影响母乳喂养。因为假体隆胸手术方法是将假体植入胸大肌下，不与乳房组织间接接触，所以在乳

房和假体之间有胸大肌作为缓冲。假体隆胸一般需要40-90分钟。假体隆胸后3天，可恢复异常生活。

综上所述，隆胸手术是否安全，和你自己的前提有很大关系。同时，选择正规的整形医院也是保证隆胸手术安全的条件。选择合适的隆胸材料是关键。当然，首先还是隆胸医生的技术水平。

以上简单介绍了决定隆胸手术安全性的四个因素。每个人都是独一无二的个体。如果你已经浏览完了，还关于‘四个因素决定隆胸手术的安全性’；欢迎咨询我们的在线整形医生，我们会根据您的个人体质和具体情况为您提供最合适的建议。