

这篇文章给大家聊聊关于抽脂手术麻醉诱导，以及抽脂手术麻醉诱导因素对应的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站哦。

本文目录

1. [女子美容院全麻抽脂，术后发现怀孕要流产，老公提离婚，咋回事？](#)
2. [抽脂减肥的风险有多大？有多痛苦？](#)
3. [吸脂这个技术现在成熟么？](#)
4. [吸脂手术局部麻醉都是一样的吧？有分不同做法？](#)
5. [吸脂是什么](#)

女子美容院全麻抽脂，术后发现怀孕要流产，老公提离婚，咋回事？

每个人都想变漂亮，在除了拍照视频的时候用美颜之外，有的人也喜欢在自己的身上动刀，比如刺个双眼皮，隆个鼻子，打个玻尿酸，现在有的女人对自己粗壮的大腿不满意，还可以抽脂，前不久，长沙的姚女士就在一个美容院做了一个大腿抽脂手术，但是术后发现自己怀孕了，因为手术时用了全麻，怕影响胎儿发育，姚姐就去医院做了人流手术，但是因为孩子没了，老公也和她离了婚，这让她很受打击，决定找美容院索赔

8月10日，长沙的姚女士向记者求助，说自己因为在美容院做了大腿抽脂手术时用了全麻，随后检测出自己怀孕，因为不能要这个孩子只能药流了，但是导致了家庭破裂，老公和她离了婚，她决定找美容院索赔，原来，7月上旬姚姐在美容院做手术，当时做了简单的试纸测试，没有查出来怀孕，随后就打了全麻进行抽脂手术，术后不久，7月14姚女士觉得身体不舒服去医院检查，发现自己竟然怀孕了，但是因为打了全麻，这个孩子怕是畸形，所以没敢要，就做了人流，随后也因此和丈夫离了婚，她觉得都是美容院的错，没有做好自己术前的体检。

随后，急着带着姚女士来到美容院，美容院的负责人表示，他们是正规的有医疗资质的美容院，所用的所有医疗试剂和设备都是合法合规的，对于姚女士提出的责任在美容院，他们表示不认同，因为现代的试纸测孕技术并不能十分精准，可能当时在手术的时候也刚怀孕10天以内，所以检测不出来，过去近半个月才检测出来，这个不是他们的责任，何况在7月份的事情，拖到8月份，本身就很难说清楚怀孕的时间，所以这个事故应该不是美容院的责任。

但是姚女士觉得，美容院没有给自己做详细的身体检查，也是他们的工作不认真，介于人道主义，美容院愿意和姚姐协商补偿事宜，最后，在8月11日，姚女士证实美容院已经赔偿给她9000元，然后她也答应了，事情也算得到圆满解决，但是很多网友表示，自己已经备孕了，为什么还要去做手术呢，这么很明显就是不负责的

家长，活该老公要离婚，也有网友说，不一定有老公，她说有知识为了增加索赔的筹码，要是感情好，怎么会因为这件事就轻易离婚呢，毕竟财产分割也是麻烦事。

所以导致离婚可能是姚女士杜撰的，就算是离婚，和做美容手术也关系不大，冰冻三尺非一日之寒，所以他们感情肯定也一般，不然不会轻易离婚的，毕竟现在的离婚成本很高，可能孩子就不是她老公才离得婚，既然有备孕你做什么微整，如果意外怀孕，哪就不能怪美容院了，自己的问题。给我的感觉，孩子流了，婚也离了，还拿到九千块钱，她很开心的啊。

也许是本来就打算离婚又省了打小孩子费用又赚9000，又有财产分腿又美了！又可以钓金龟了，打个胎跟特么打个喷嚏一样，那可是亲生骨肉啊，希望女人自重，按照她说的6月18日来大姨妈，7月10号才22天，测不出来怀孕这很正常啊，说的难听点，你做完手术后同房怀孕了也是有可能的，还能怪医院啊？既然你决定做手术肯定要严格避孕！9000块钱，一石二鸟，结婚的男人离了，怀孕的小孩被流了。

也有网友说是美容院失职，为了赚钱，早孕检测不认真，所以才造成了姚女士的家庭破裂的后果，美容院全责，你对这种看法认同吗？

抽脂减肥的风险有多大？有多痛苦？

抽脂减肥的风险大致来源于三个方面：禁忌人群、医生、术后护理。

1、禁忌人群

抽脂最佳适应症是单纯性局部脂肪堆积。

对于男性腰腹部肥胖者，应正确评价皮下脂肪所占比重，毕竟大多数腹部肥胖的男性脂肪往往沉积于腹腔内的大网膜和肠系膜周围，若单纯抽吸皮下脂肪并不能大幅度改善腹部膨隆的程度。。

儿童身体发育还不完善，体内脂肪数目不恒定。如果盲目抽脂，不仅可致反弹，还会破坏儿童的生长周期，危害健康。

继发于其他疾病而发生的继发性肥胖，须针对原发病进行治疗，也不属于抽脂术治疗范围。

全身重度肥胖、高血压、冠心病、肾功能异常、高血脂、高血糖、肺功能不全的人及凝血功能异常者，属手术禁忌者之列。

2、医生

若术中不慎损伤重要血管，可导致异常出血;

若术中局部反复抽吸过度造成皮下局部形成死腔，其腔隙内积聚了血清样液体，就会形成血清肿;

若吸脂过程中吸脂管头部对皮肤内神经的细小穿支及末梢的钝性损伤，也存在抽吸层次过深导致不同程度的皮神经损伤的情况;

抽吸过浅、过度或过于粗暴可造成真皮下血管网损伤致局部缺血性坏死...

总的来讲，医生的技术水平、临床经验以及对人体解剖结构的熟悉程度都是这些并发症出现的主要原因，一所正规的医院和专业的医生是保障吸脂手术安全的关键。

3、术后护理

当天吸脂部位会瘀肿疼痛，病人不要急于吃去痛片，因为阿斯匹林类药物会加重伤口出血。

手术后可对局部伤口加压包扎或用冰袋冷敷，但压力不宜大，用力过大会使局部供血不足而坏死。

术后7天之内尽量避免手术部位沾水。保证手术部位清洁，防止感染。一般术后第7天可以拆线，拆线后24小时也就可以洗澡了，但要注意避免蒸桑拿、避免池浴、避免大幅度活动。

抽脂减肥有多痛苦?

(图片来源于网络，仅供参考)

抽脂时会使用各种麻醉，部位不同的手术方式不同，麻醉方式也不同，所以说一般术中不会出现疼痛，但是术后麻醉过了会感到轻微疼痛与不适。

如果是小范围抽脂，一般会在局麻下进行，打局麻时是比较疼的。大范围抽脂可能会在全麻下进行，比较舒适，术后会给抽脂部位穿上塑身衣、加压服来将其压紧，但疼痛一定会有的，尤其是术后48小时内会比较明显，48小时后，疼痛会慢慢减轻，不过大部分人可能一周内都会觉得有点疼。

欲了解更多“抽脂减肥”的相关问题，可关注头条号：整形医生祝东升。

吸脂这个技术现在成熟么？

一、中国的第一台吸脂手术是在1987年，经过30多年的发展。

现在的麻醉技术、吸脂技术、手术室环境、手术器具的改善与进步，大家有目共睹。

虽然现在吸脂手术很成熟也相对安全，

但吸脂是一项严谨的外科手术，

比如，

术前注射麻药，麻醉范畴不够、不均、麻药浓度太低都会导致手术中疼痛出现。

二、不是随便一家医院或者美容院就有资格操作！

负责的讲，

·吸脂操作过于粗暴使血管损伤，脂肪颗粒进入到血管内导致脂肪栓塞，严重可以危及生命的；

·由于吸脂操作不当导致的局部不平，不易塑形。

·吸脂层次过深或过于粗暴导致的出血或血肿；

·局部抽吸过度导致的皮肤缺血坏死；

·其他还有感染、腹腔脏器或神经损伤等风险。

三、求美者要如何避免吸脂手术风险？

避免手术风险主要是操作的医生要手术绝对熟练，吸脂手术看似是很简单的手术，其实不是。

看似简单的吸脂操作过程，其实有很多技巧。

很多没有经验的医生吸脂后患者会有凹凸不平很明显的现象，手术修复起来非常麻烦。

提醒大家的是，一般的整形外科门诊部是不能操作吸脂塑形、假体隆胸、自体脂肪隆胸等复杂项目，否则很容易引发不良后果。

另外，北京、上海、广州等一线城市，整形医生的吸脂技术水平，以及配套的手术室环境、手术器具、甚至术后护理指导的话，都会相比其他地区做的好。毕竟比较好的配套设施资源、医生资源汇集在这些地方。

所以，求美者最好选择就近的大城市里的正规医院和经验丰富的医生。

四、安全的吸脂，还要注意这几点：

1、有以下疾病或情况，避免做吸脂手术：心血管疾病、糖尿病、凝血障碍、血栓性静脉炎、药物严重过敏等。

2、孕妇、经期不可接受吸脂手术。

3、' 未成年人以及55岁以上的女性，避免做抽脂手术。

4、全身肥胖者不适合做，因为吸脂的目的是塑形，改善曲线，而不是减肥。

5、单次吸脂在2000-3000毫升，但总量一般不超过5000毫升，5000毫升脂肪的重量≈3公斤。可恢复半年后进行二次吸脂

6、个人建议，不是太了解身体状况的，可以先做个全身检查，看是否适合做吸脂手术。

整形医师郎岳原创，关注一下吧。

吸脂手术局部麻醉都是一样的吧?有分不同做法？

您好，很开心回答您的这个问题。

麻醉药分全身麻醉药和局部麻醉药两种。全身麻醉药由浅入深抑制大脑皮层，使人神志消失。局部麻醉对神经的膜电位起稳定作用或降低膜对钠离子的通透性，阻断神经冲动的传导，起局部麻醉作用。

全身麻醉药用于大型手术或不能用局部麻醉药的患者。最早使用的全身麻醉药是笑气，它性能稳定，适合任何方式麻醉，但有易缺氧、麻醉者不够稳定等缺点。后来改用乙醚作全身麻醉药，它有麻醉状况稳定、肌肉松弛良好，便于手术等优点。但它易燃、置放过久会产生过氧化物。使用乙醚时应绝对避火和经检查无过氧化物。

局部麻醉药适用于小型手术或局部手术的麻醉药。使用局部麻醉药时，需加一点血管收缩剂，如肾上腺素。最常用的局部麻醉剂是普鲁卡因盐酸盐，用于局麻是0.5~1%的溶液，每次用量不能超过1g，静脉注射常用0.1%的溶液。其他如丁卡因盐酸盐、利多卡因盐酸盐，都能用作局部麻醉剂。它们的功能跟普鲁卡因大同小异，价格都比普鲁卡因盐酸盐高，常给普鲁卡因过敏者使用

局部麻醉要比全身麻醉好！但有些手术还是要用全身麻醉的！！

以上就是对于这个问题的回答，希望能够帮助到您！

吸脂是什么

很简单的说：就是在你脂肪堆积过多的地方开一个小口，然后往里面打肿胀液分离脂肪，通过负压的方式吸出来，这是最常见的也是最广泛的吸脂方式

关于抽脂手术麻醉诱导，抽脂手术麻醉诱导因素的介绍到此结束，希望对大家有所帮助。