

大家好，今天来为大家分享18岁牙齿不齐如何纠正呢的一些知识点，和18岁牙齿不齐如何纠正呢视频的问题解析，大家要是都明白，那么可以忽略，如果不太清楚的话可以看看本篇文章，相信很大概率可以解决您的问题，接下来我们就一起来看看吧！

本文目录

1. [儿童牙齿矫正要多长的时间？](#)
2. [我家大女儿13岁，牙齿很不齐，我想知道多大年龄给她做牙齿矫正合适？](#)
3. [32岁牙齿不整齐，想戴牙套，大家有什么建议和经验分享？](#)
4. [多大年纪做牙齿矫正比较好？](#)
5. [有一颗牙齿高低不平，问磨平可以吗](#)

儿童牙齿矫正要多长的时间？

天津市中诺口腔医院回答：

牙齿矫正一般需要2年的时间，因患者口腔状况不同所以矫正时间也都是不同的具体的时间要根据患者的口腔状况为准。

带牙套期间一定要注意口腔卫生，最好每次吃完东西后都要刷牙；因为不刷牙的话，容易导致牙龈炎，严重的话，会加重牙齿的松动度，不利于牙齿的健康。如果实在没办法每次吃完东西都刷；每天至少早，中，晚餐后各刷一次。

我家大女儿13岁，牙齿很不齐，我想知道多大年龄给她做牙齿矫正合适？

其实这阶段就可以进行牙齿矫正。12-18岁是孩子的恒牙期，这时候乳牙已经全部换完，第二颗大牙和第三颗大牙萌出时为又一快速生长期。所以可以进行牙齿矫正了。

32岁牙齿不整齐，想戴牙套，大家有什么建议和经验分享？

矫正牙齿最好的年龄是在11到14岁，当然不管你是什么年龄，只要你的牙齿情况健康，都是可以矫正的。只不过越小的年龄矫正，矫正的时间就短一些，像现在成年人矫正最少需要俩年的时间，甚至更久。

对于矫正牙齿，很多人都非常犹豫。因为牙齿对我们来说很重要，而且一但弄的不好就是一辈子的事。主要跟多人不太了解牙齿矫正，觉得矫正了之后，到年纪大了

牙齿就会掉的早，这是一个误区，根本不存在这个问题。

像一般最常见的需要矫正的牙齿可能是龅牙、牙齿不齐、地包天或者是牙齿咬合不好等，既然你有矫正的想法，那就去医院面诊，根据你的牙齿情况，医生会给出矫正方案，当然一定不要去一些小诊所，去正规的口腔医院。医生给出方案后，看你是否能接受，因为像很多牙齿矫正都需要拔掉四颗健康牙，另外已经长出的智齿也是需要拔掉的，这也是要看你的牙齿情况的，有条件的话还是建议多去几家医院咨询，选择好了正规的口腔医院那就不需要担心了，好好配合医生，按时复诊就好。矫正牙齿没有后遗症，唯一需要注意的就是矫正结束之后一定要按时戴保持器，不然牙齿还会反弹回原来的样子。

还有一个就是矫正的价格，价格的话是不等的。看你在哪个城市，还有你想选择哪种矫正方式。常见的就是金属自锁，还有陶瓷和隐形。后两者在美观上面会好一点，但是金属钢丝的矫正效果是最好的。所以有想法的话就去医院咨询医生，他们会给你最专业的建议。

多大年纪做牙齿矫正比较好？

内容导读：不少传统观念认为“只有12岁后才能矫牙”，这让很多父母纠结、犹豫，但遵循现代临床医学科学规律分析，20种牙颌畸形或异常必须在12岁前发现即矫正，别犹豫！

严重的大龅（暴）牙：龅牙患者非常不自信，因此不敢与人交流，不敢笑，极大程度影响了学业和社交，有的孩子变得自卑，也应及时矫正。

替牙期严重的牙齿拥挤：替牙期一般轻度拥挤可观察，暂不处理；严重者，表现为个别或多个牙齿在各个方向的错位；而且牙齿拥挤也妨碍局部牙齿的清洁而好发蛀牙、牙龈炎等。

反牙合：俗称“地包天”，即下排牙齿包住上排牙齿。严重影响面容美观，导致吃饭，咀嚼功能下降，加重胃肠负担，从而影响身体健康。有时候还会影响发音，受到嘲笑，影响心理健康。

个别牙反合：即个别门牙或两颗牙反合，危害极大。会影响上面部的正常发育，上唇部凹陷。而且，其潜在的危害是，最有可能导致儿童成长到30至40岁时出现颞下颌关节紊乱病。

偏颌：由于一边的牙齿龋坏或缺失等原因，长期用另外一边吃东西或其他原因，导致双侧脸型不对称，严重影响孩子的心理健康和自尊心。

下颌后缩:下巴发育不足，小下巴，俗称鸟嘴。影响面部美观，同时因为下排牙齿排列过窄，限制了上排牙齿的发育，也影响功能。

乳牙早失:乳牙没到替换时间就过早脱落，会使局部颌骨发育不足，缺牙的位置可因邻牙移位导致部分甚至全部被占据，以致恒牙错位萌出或埋伏阻生而形成牙颌畸形。

乳牙滞留:乳牙到了替换时间仍未脱落退位，导致后继接班的恒牙萌出受阻，出现萌出顺序异常、或错位萌出、或埋伏阻生，造成牙齿排列及咬合不正。

睡眠时张口呼吸:此症多由于鼻腔堵塞或腺样体肥大等原因造成鼻呼吸不畅，会引起唇外翻和唇短而厚、上腭高拱脸变窄、前突、长面型、下巴后缩及后牙咬不拢。

多生牙:口腔内特别是上门牙间有多余的牙齿。多生牙多为畸形牙，它们占据了正常牙的位置，致使这些正常的牙齿出现错位或萌出障碍。

恒牙不萌出或埋伏阻生:阻生牙是指牙齿部分萌出或完全不能萌出，并且以后也不能萌出的牙。儿童期门牙多见。可通过助萌或牵引等方法改善。

睡眠时打鼾:打鼾由于鼻腔阻塞，呼吸方式不正确，上下牙齿咬合不正确，久之会导致面部畸形，如面部狭长、下牙外露、开唇露齿等，严重影响孩子的外貌。

蛀牙不及时修补:乳牙因为蛀牙导致所占据的位置变小，会使恒牙萌出时没有足够的位置，因此出现拥挤和不齐，甚至影响继承恒牙的替换和萌出。因此乳牙烂了一样要补。

唇系带异常:唇系带附着于上排中间两颗门牙之间的外侧牙龈和牙槽粘膜之间，如果随着年龄增长，孩子的系带没有随之退缩，就会导致上门牙之间出现较大的缝隙。

舌系带异常:先天性发育异常。舌系带过短，使舌的正常活动受到限制，严重者舌头不能伸长到口外，或不能接触上唇。影响吮乳、音语和发音。

唇腭裂术后:唇腭裂术后并非万事大吉，还必须需要进行长达数年的系列正畸治疗，以最大限度的获得良好的外貌和生理功能。

不良唇习惯:包括咬下唇、吮吸下唇、下唇兜上唇等。这会造成上唇过短、开唇露齿及下唇内陷。

不良吮指习惯:儿童3岁后仍持续存在吮吸手指行为，会造成前牙咬不拢、儿童上下门牙前突等畸形，严重者可能影响到上下骨骼发育而造成面部畸形。

不良舌习惯:伸舌、吐舌、舐舌、顶舌等都是不良舌习惯，会造成牙齿向外错位、前突、牙缝、牙齿咬不拢或者地包天等，必须及时纠正。

恒牙早失：儿童生长的第一个恒磨牙，即第一大臼齿。每个人上下左右各1个共4个。一般情况下此牙在六岁左右萌出，故俗称为“六龄齿”。“六龄齿”龋坏率最高，拔除的比例和罹患其它牙病的发生率均比其它牙高。从功能上说该牙又是最重要的大臼齿，失去六龄牙易致牙齿排列不齐，而且矫治难度会加大很多，因此要特别重视“六龄齿”的保护。

有一颗牙齿高低不平，问磨平可以吗

有一颗牙齿高低不平，磨平是不可以的，会伤害牙齿。牙齿是人体最硬的器官，除担负切咬、咀嚼等功能外，还起保持面部外形和辅助发音等作用。牙齿可分为切牙（门牙）、尖牙（虎牙）、前磨牙和磨牙4种。每个牙齿均由露在牙槽骨外的牙冠和长在牙槽骨内的牙根，以及牙冠、牙根之间的牙颈组成。

关于18岁牙齿不齐如何纠正呢的内容到此结束，希望对大家有所帮助。