

本篇文章给大家谈谈全切双眼皮半年有肉条还可以消除吗，以及全切双眼皮半年有肉条还可以消除吗图片对应的知识点，文章可能有点长，但是希望大家可以阅读完，增长自己的知识，最重要的是希望对各位有所帮助，可以解决了您的问题，不要忘了收藏本站喔。

本文目录

1. [全切双眼皮肉条怎么办](#)
2. [双眼皮肉条多久消](#)
3. [全切双眼皮已经2年了，有很明显的肉条，修复难度大吗？](#)
4. [双眼皮手术之后出现肉条怎么办是什么原因造成的](#)
5. [全切双眼皮出现肉条是什么原因](#)

全切双眼皮肉条怎么办

全切双眼皮以后，如果在术后出现了有肉条的情况，很有可能是因为在手术之后出现了疤痕增生的原因引起的，这种情况也属于很正常的，一般在做双眼皮15天左右就会出现这种情况，而且等到三个月左右的时候就可以完全消失的，具体的情况也因人而异

双眼皮肉条多久消

全切双眼皮的话，肉条一般是10天左右会消退。但是也是分情况的，全切双眼皮术后有肿胀，这样的肉条一般是以三个月为界限，如果三个月内，肉条没有消退，是需要在恢复期后做修复手术的。

还有一种就是没有去除眼轮匝肌，这样的肉条是消不掉的。

全切双眼皮已经2年了，有很明显的肉条，修复难度大吗？

双眼皮修复难度大和小主要根据个人的实际情况确定。有的人可能修复了多次，组织破坏严重，难度就会增加！

肉条的形成首先要分析形成的原因，这是修复的前提。常见的肉条形成原因有：

- 1、设计过宽或者提肌力量不够；
- 2、重睑线下方的皮肤没有提紧，向前卷曲凸起；（这个实际上并不完全是肉条，天生的双眼皮很多都有这个）

3、重睑线下方的睑板前组织去除不合理；

4、重睑线位置脂肪和眼轮匝肌去取过多，形成凹痕显得有肉条

肉条眼的修复，只能是通过全切来实现，重新设计双眼皮的宽度，找出形成肉条的原因，松解瘢痕、粘连最后耐心遵从医嘱护理等待漫长的恢复期，这期间会再次出现“假性肉条”一定不要惊恐和害怕，一定要安心的度过恢复期。看似简单的几句话，真正做起来却很难，医生必须清楚的了解眼部的组织和解剖层次，手术操作也是复杂漫长的过程，一台修复手术的时间往往是初次双眼皮时间的3-4倍，甚至更长，术中一定要求美者耐心的配合医生。

分享一个肉条眼修复案例：小姑娘眼睛做过一次埋线，后来有经历了两次全切修复，结果双眼不对称，肉条明显。分析肉条形成的原因：1、设计过宽；2、多次修复后粘连和瘢痕。

手术方案：降窄，去除瘢痕，松解粘连。

术后：自然、有神，双眼皮窄了眼睛反而大了！

总结：肉条的形成多与双眼皮太宽有关，大家选择双眼皮手术的时候一定要注意这一点，修复手术更是如此，消除肉条的结果必然会降低双眼皮的宽度，没有认识到这些就不要轻易尝试！

双眼皮手术之后出现肉条怎么办是什么原因造成的

假性肉条

通常情况下，双眼皮手术会有一个月左右的肿胀期，全切双眼皮需要3-6个月的时间眼睛的形态才会组建恢复到自然，所以消肿期间存在的肉条一般为假性肉条。

真性肉条

通常来说，如果六个月之后，双眼皮线的下方至睑缘之间还有很肿的肉条形状，而且是增厚的状态，那就大致可以判断是真性肉条了，这时就需要做双眼皮修复手术了。

出现的原因

1、手术中出血导致

割双眼皮手术中，医生如果动作粗暴，那么就会导致双眼皮皮肤组织下积血，这种积血和肿胀的反应就会形成割双眼皮之后的肉条感，并且触摸起来有硬硬的感觉，一般持续3-6个月。等到6个月之后会自然软化，肉条感的症状便会逐渐缓和至消失。

2、双眼皮割宽了导致

东方人的睑板很窄，但是双眼皮又只能放在睑板上，切得过宽以后，双眼皮的宽度已经超过了睑板的宽度，就会导致过宽的那些皮肤不能展平，堆积在睑板上，形成肉条的形状。需要进行双眼皮修复手术。

3、未去除脂肪导致

如果求美者是肿眼泡，而刚好没有做上眼睑的脂肪的去除，就会导致割完双眼皮出现肉条感。其实，错误地使用了埋线法也会导致肉条感的情况出现。

4、眼轮匝肌去除过多导致

如果手术医生在割双眼皮的过程中，将眼轮匝肌去除多了，导致重睑线位置明显凹陷，那么重睑线以下的肉条感就会比较明显。在修复的时候就必须把双眼皮上面的筋膜层，肌肉层全部打开，让正常新鲜的组织填补在这个疤痕上面。

全切双眼皮出现肉条是什么原因

双眼皮肉条的形成主要有两类：

1局部组织破坏过多，循环形成缓慢，2皮肤设计线与深层粘连宽度不一致，造成睑板前组织堆积。但因皮下组织因伤而愈合和恢复。肉条就是疤痕增生期出现的情况

全切双眼皮半年有肉条还可以消除吗的介绍就聊到这里吧，感谢你花时间阅读本站内容，更多关于全切双眼皮半年有肉条还可以消除吗图片、全切双眼皮半年有肉条还可以消除吗的信息别忘了在本站进行查找哦。